

# YURIKO

CEBADA DE CICLO LARGO



## MORFOLOGÍA

### PLANTA

Porte: SEMIERECTO

Altura: ALTA

+ 10 cm/HISPANIC + 10 cm/MESETA

+ 15 cm/PEWTER

### ESPIGA

Tipo según fertilidad espiguillas laterales: SEIS CARRERAS

## CALIDAD DEL GRANO

Peso del hectólitro: MEDIO

Calibre: MEDIO A ALTO

Contenido en proteína: MEDIO A ALTO

## CICLO

Alternatividad

TIPO MEDIO INVIERNO

FECHA

Inicio Encañado: MEDIA A PRECOZ

Espigado: MUY PRECOZ

- 2 días/HISPANIC - 5 días/MESETA

- 6 días/PEWTER

Madurez: PRECOZ

- 2 días/HISPANIC - 5 días/MESETA

- 3 días/PEWTER

## PRODUCCIÓN DE GRANO

Índice productivo medio por año.

	RED OEVV*		RED GENVE **		INDICE MEDIO
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
YURIKO	106,7	97,8	106,2	120,7	109,4
HISPANIC (T)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
MESETA	-	-	100,3	107,4	-
PEWTER	-	-	98,4	111,5	-
Índice 100 (kg/ha)	4894	4642	5000	4256	4667
Nº ensayos	15	15	23	26	79

Índice productivo medio por zona.

	Frias semiáridas	Frias húmedas	Templadas
YURIKO	104,1	107,8	110,8
HISPANIC (T)	99,0	94,2	98,3
MESETA (T)	98,4	101,8	100,3
PEWTER (T)	102,6	104,0	101,4
Índice 100 (kg/ha)	3547	6013	4341
Nº ensayos	7	15	28

Información elaborada con los datos de las campañas 2010-2011 y 2011-2012.  
(T) Variedad testigo.

\* Oficina Española de Variedades Vegetales.

\*\* Grupo para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos en España.

(T) Variedad testigo.

## COMPORTAMIENTO MEDIO FRENTE A ENFERMEDADES CRIPTOGÁMICAS Y ACCIDENTES<sup>(1)</sup>



## FORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Capacidad de ahijamiento: BAJA

Peso de 1000 granos: BAJO



SEMILLAS **Lh**

H.L. LÓPEZ HORTELANO, S.L.U.

SEMILLA CERTIFICADA Y  
ACONDICIONAMIENTO DE GRANO PARA SIEMBRA